

# Invariants de similitude

Nous montrons l'existence et l'unicité des invariants de similitude d'un endomorphisme d'un espace de dimension finie en utilisant la dualité.

Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension finie  $n \geq 1$  sur un corps commutatif  $\mathbb{K}$ . Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

[GOU21]  
p. 398

**Notation 1.** Soit  $x \in E$ . On note  $P_x$  le polynôme unitaire engendrant l'idéal  $\{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(f)(x) = 0\}$  (un tel polynôme existe car  $\mathbb{K}[X]$  est principal et cet idéal est non réduit à  $\{0\}$ ) et  $E_x = \{P(f)(x) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}$ .

**Lemme 2.** (i) Si  $k = \deg(\pi_f)$ , alors  $\mathbb{K}[f]$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{L}(E)$  de dimension  $k$ , dont une base est  $(f^i)_{i \in \llbracket 0, k-1 \rrbracket}$ .  
(ii) Soit  $x \in E$ . Si  $l = \deg(P_x)$ , alors  $E_x$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  de dimension  $l$ , dont une base est  $(f^i(x))_{i \in \llbracket 0, l-1 \rrbracket}$ .

*Démonstration.* (i) Montrons que la famille  $(f^i)_{i \in \llbracket 0, k-1 \rrbracket}$  est à la fois libre et génératrice.

p. 61

- Soit  $P(f) \in \mathbb{K}[f]$ . On fait la division euclidienne de  $P$  par  $\pi_f$  dans  $\mathbb{K}[X]$  pour écrire  $P = \pi_f Q + R$  avec  $Q, R \in \mathbb{K}[X]$  et  $\deg(R) < k = \deg(\pi_f)$ . En évaluant en  $f$ , cela donne  $P(f) = R(f) \in \text{Vect}(\text{id}_E, \dots, f^{k-1})$ . Donc la famille est génératrice.
- Si  $\sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i f^i = 0$ , alors le polynôme  $P = \sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i X^i$  vérifie  $P(f) = 0$ . Donc  $\pi_f \mid P$ , et comme  $\deg(P) < \deg(\pi_f)$ , on a  $P = 0$ . Donc  $\lambda_0 = \dots = \lambda_{k-1} = 0$ . Donc la famille est libre.

(ii) La deuxième assertion se montre sensiblement de la même manière. □

**Lemme 3.** Il existe  $x \in E$  tel que  $P_x = \pi_f$ .

p. 290

*Remarque 4.* La démonstration est un peu trop longue pour être incluse ici : c'est un résultat qui demande du temps pour le démontrer (et pourrait constituer un vrai développement à part entière). Nous vous renvoyons vers [GOU21] p. 178 pour la démonstration.

**Théorème 5** (Frobenius). Il existe des sous-espaces vectoriels  $F_1, \dots, F_r$  de  $E$  tous stables par  $f$  tels que :

- (i)  $E = \bigoplus_{i=1}^r F_i$ .
- (ii)  $\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket$ , la restriction  $f_i = f|_{F_i}$  est un endomorphisme cyclique de  $F_i$ .
- (iii) Si  $P_i = \pi_{f_i}$  est le polynôme minimal de  $f_i$ , on a  $P_{i+1} \mid P_i \forall i \in \llbracket 1, r-1 \rrbracket$ .

La suite  $(P_i)_{i \in \llbracket 1, r \rrbracket}$  ne dépend que de  $f$  et non du choix de la décomposition (elle est donc unique). On l'appelle **suite des invariants de  $f$** .

*Démonstration.* — Existence : Soit  $k = \deg(\pi_f)$ . Par le Lemme 3, il existe  $x \in E$  tel que  $P_x = \pi_f$ . Par le Lemme 2, le sous-espace  $F = E_x$  est de dimension  $k$  et est stable par  $f$  et comme  $\deg(P_x) = k$ , la famille de vecteurs

$$\left( \underbrace{x}_{=e_1}, \dots, \underbrace{f^{k-1}(x)}_{=e_k} \right)$$

forme une base de  $F$ . Complétons cette base en une base  $(e_1, \dots, e_n)$  de  $E$ . En désignant par  $(e_1^*, \dots, e_n^*)$  la base duale associée et en notant  $\Gamma = \{e_k^* \circ f^i \mid i \in \mathbb{N}\}$ , on pose

$$\begin{aligned} G &= \Gamma^\circ \\ &= \{x \in E \mid \forall i \in \mathbb{N}, (e_k^* \circ f^i)(x) = 0\} \end{aligned}$$

Ainsi,  $G$  est l'ensemble des  $x \in E$  tel que la  $k$ -ième coordonnée de  $f^i(x)$  (dans la base  $(e_1, \dots, e_n)$ ) est nulle  $\forall i \in \mathbb{N}$ ;  $G$  est donc un sous-espace de  $E$  stable par  $f$ . Montrons que  $F \oplus G = E$ .

Montrons que  $F \cap G = \{0\}$ . Soit  $y \in F \cap G$ . Si  $y \neq 0$ , on peut écrire  $y = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_p e_p$  avec  $\lambda_p \neq 0$  et  $p \leq k$ . En composant par  $e_k^* \circ f^{k-p}$ , on obtient

$$\begin{aligned} 0 &= \underset{y \in G}{e_k^* \circ f^{k-p}}(y) \\ &= e_k^*(\lambda_1 f^{k-p}(e_1) + \dots + \lambda_p f^{k-p}(e_p)) \\ &= e_k^*(\lambda_1 f^{k-p}(x) + \dots + \lambda_p f^{k-p}(x)) \\ &= \lambda_p \end{aligned}$$

Ce qui est absurde.

Montrons que  $\dim(F) + \dim(G) = n$ . Cela revient à montrer que  $\dim(G) = n - k$ . On sait que  $G = \Gamma^\circ = (\text{Vect}(\Gamma))^\circ$  et  $\dim(\text{Vect}(\Gamma)) + \dim(\text{Vect}(\Gamma)^\circ) = n$ . Montrons donc que  $\dim(\text{Vect}(\Gamma)) = k$ . Posons

$$\varphi: \begin{array}{ccc} \mathbb{K}[f] & \rightarrow & \text{Vect}(\Gamma) \\ g & \mapsto & e_k^* \circ g \end{array}$$

Par définition de  $\Gamma$ ,  $\varphi$  est surjective. Soit  $g \in \text{Ker}(\varphi)$ . On a alors  $e_k^* \circ g = 0$ , et comme  $g \in \mathbb{K}[f]$ ,

$$g = \lambda_1 \text{id} + \dots + \lambda_p f^{p-1} \text{ avec } \lambda_p \neq 0 \text{ et } p \leq k$$

On a donc  $0 = e_k^* \circ g(f^{k-p}(x)) = \lambda_p \neq 0$ . Ainsi,  $g = 0$  et  $\varphi$  est un isomorphisme. Donc  $\dim(\text{Vect}(\Gamma)) = \dim(\mathbb{K}[f]) = k$  par le Lemme 2, ce que l'on voulait.

Soit  $P_1$  le polynôme minimal de  $f|_F$  (qui est le polynôme minimal de  $f$  car  $P_1 = \pi_{f|_F} = \pi_f = P_x$ ). Soit  $P_2$  le polynôme minimal de  $f|_G$ . Comme  $G$  est stable par  $f$ , on a  $P_1(f|_G) = \pi_f(f|_G) = 0$ , donc  $P_2 \mid P_1$ . Il suffit alors de réitérer en remplaçant  $f$  par  $f|_G$  et  $E$  par  $G$  pour obtenir la décomposition voulu.

— Unicité : Soient  $F_1, \dots, F_r$  et  $G_1, \dots, G_s$  des sous-espaces vectoriels stables par  $f$  qui vérifient le Point (i), le Point (ii) et le Point (iii). On note pour tout  $i$ ,  $P_i = \pi_{f|_{F_i}}$  et  $Q_i = \pi_{f|_{G_i}}$ . On suppose par l'absurde  $(P_1, \dots, P_r) \neq (Q_1, \dots, Q_s)$ . Soit  $j = \min\{i \mid P_i \neq Q_i\}$ . Comme  $E = \bigoplus_{i=1}^r F_i$  (où

$\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket$ ,  $F_i$  est stable par  $f$  et  $\forall k \geq j \geq 1$ ,  $P_j(f)(F_k) = 0$  :

$$P_j(f)(F_1) \oplus \cdots \oplus P_j(f)(F_{j-1}) = P_j(f)(E) \quad (*)$$

De même,

$$P_j(f)(G_1) \oplus \cdots \oplus P_j(f)(G_{j-1}) \oplus P_j(f)(G_j) \oplus \cdots \oplus P_j(f)(G_s) = P_j(f)(E) \quad (**)$$

Notons que l'on a  $\forall i \in \llbracket 1, j-1 \rrbracket$ ,  $\dim(P_j(f)(F_i)) = \dim(P_j(f)(G_i))$ . En effet, on peut trouver une base  $\mathcal{B}_i$  de  $F_i$  et une base  $\mathcal{B}'_i$  de  $G_i$  telles que  $\text{Mat}(f|_{F_i}, \mathcal{B}_i) = \text{Mat}(f|_{G_i}, \mathcal{B}'_i)$  par cyclicité de  $f|_{F_i}$  et  $f|_{G_i}$ . En prenant les dimensions dans (\*) et (\*\*), on en déduit :

$$0 = \dim(P_j(f)(G_j)) = \cdots = \dim(P_j(f)(G_s)) \implies Q_j \mid P_j$$

Par symétrie, on a de même  $P_j \mid Q_j$ . D'où  $P_j = Q_j$  : absurde.

□

# Bibliographie

Les maths en tête

[GOU21]

---

Xavier GOURDON. *Les maths en tête. Algèbre et probabilités*. 3<sup>e</sup> éd. Ellipses, 13 juill. 2021.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/13722-25266-les-maths-en-tete-algebre-et-probabilites-3e-edition-9782340056763.html>.